LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

BOSTON MEDICAL LIBRARY JUL 11 1906

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. Desfosses. Étude sur la scoliose dorsale.

J. Sabrazès, J. Bonnes et Parsat. Macroglossite œdémateuse aiguë.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de neurologie. — Épithélioma primitif du cerveau. — Lésions cellulaires produites par le sérum névrotoxique. — Tic convulsif de la face guéri par des injections d'alcool. — Deux cas de poliomyélite antérieure aiguë de l'adulte. — Les courants continus dans la névralgie du trijumeau. — Troubles des mouvements conjugués des yeux dans un cas de fracture du crâne. — Atrophie musculaire et osseuse chez des nègres de l'Afrique centrale.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — Pathogénie réflexe de l'orchite double syphilitique. — Sclérose syphilitique persistant vingt à trente ans après le chancre. — Xanthome juvénile offrant les caractères du xanthome diabétique. — Réparation spontanée de plaies chirurgicales ouvertes consécutives à l'extirpation de cancers de la peau. — A propos d'une soi-disant intoxication par le dermatol. — Nouveau benzoate de mercure soluble. — Iodisme postérieur à la cessation du traitement ioduré.

Société médicale des hôpitaux. — L'hypertension par rétention chlorurée et la cachexie cardio-rénale. — Un nouveau signe du pyo-pneumothorax : la succussion horizontale. — Tic douloureux de la face guéri par la radiothérapie. — Un cas d'anévrisme de l'aorte avec rupture dans l'œsophage.

Société de chirurgie. — Rétrécissement congénital de l'urètre. — Anévrisme traumatique de l'artère axillaire; ligature; guérison. — Procédé de radiothérapie permettant d'éviter la radiodermite. — Œsophagotomie externe pour corps étranger (dentier) de l'œsophage; mort. — Orchidopexie. — Suture osseuse. — Rupture des voies biliaires.

Société de biologie. — Physiologie comparée de la mécanique respiratoire dans la série animale. — Transmission de la rage par coup de griffe. — Confirmation orthodiagraphique de la réduction, par le bain carbo-gazeux, du volume du cœur dilaté. — Températures sous-vestiales et températures rectales chez le nouveau-né à terme. — Constituants colloïdes du sang. Globulines et fibrine. La coagulation. — La déchloruration fécale. — Sur le bacille tuberculeux cultivé en milieu sucré. — Note sur la régénération collatérale des neurones radiculaires postérieurs dans le tabes et sur la signification physiologique des cellules pourvues d'appendices terminés par des bouts encapsulés de R. y Cajal.

Académie de médecine. — Localisations lobaires hépatiques. — De l'aortite abdominale par propagation; ses rapports avec la gastrite et avec l'appendicite. — Demandes d'autorisation d'eaux minérales. — Prothèse dentaire et les végétations adénoïdes. — Guérison de trois anévrismes par la médication hypotensive. — Présentation d'appareil. — Recherches sur la syphilis. — Hypertrophie compensatrice du péroné dans une luxation ancienne du tibia. — Luxation récidivante de l'épaule guérie par l'arthrotomie.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — Levaditi. L'histologie pathologique de la syphilis héréditaire dans ses rapports avec le « spirochæte pallida ».

Chirurgie. — R. Igonet. Du drainage dans les laparotomies.

Gynécologie. — M. Rollin. Le sarcome du vagin chez l'enfant.

Vénéréologie. — Bertarelli et Volpino. Nouvelles recherches sur la présence de Spirochæte pallida dans les coupes de lésions syphilitiques primaires, secondaires et tertiaires.

Neurologie et Psychiatrie. — F. Rybakov. Les maladies psychiques en rapport avec les événements politiques russes.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — Maxumban Herzog. Le béribéri dans l'armée japonaise durant la dernière guerre. Le kakke coccus de Okata-Kokubo. — H. Wolpert et F. Peters. La courbe journalière de la perte d'eau chez l'homme. — H. Wolpert et F. Peters. L'influence du travail sur l'évaporation aqueuse chez l'homme.

Électricité médicale. Radiologie. — Challamel. La d'Arsonvalisation dans l'hypertension artérielle. — Denis Courtade. Pathogénie et traitement électrique de l'attaque d'asthme.

CHRONIQUE

Coullaud. La vision des tireurs.

PRATIQUE MÉDICALE

M. de Kervily. Traitement de la néphrite de la scarlatine par l'essence de térébenthine.

LIVRES NOUVEAUX

Cassaigneau. Essai sur un quatrième état de la matière.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LA VISION DES TIREURS

C'est une opinion généralement admise dans le public qu'il faut, pour devenir un tireur émérite, surtout aux grandes distances, posséder une bonne vue, ou, pour employer une expression plus précise, avoir une acuité visuelle normale.

Les expériences du champ de tir et des observations journalières démentent cette assertion. MM. E. Ginestous (de Bordeaux) et H. Coullaud, médecin-major au régiment de sapeurs-pompiers de Paris, viennent d'étudier les conditions que doit remplir l'appareil oculaire pour permettre avec succès l'exercice du tir.

* * *

Pour établir la base de leur travail, les auteurs ont eu recours à deux sources de renseignements. Ils ont, dans un régiment d'infanterie (le régiment de sapeurs-pompiers de Paris), procédé à l'examen clinique oculaire :

1° Des 25 meilleurs tireurs du régiment;
2° Des 25 plus mauvais tireurs;
3° Des hommes qui tirent en épaulant à gauche;
4° Des hommes tirant les deux yeux ouverts.

Ils ont ainsi recueilli 86 observations, relatant dans chacune de ces catégories l'acuité visuelle, la réfraction, et ont pu comparer ces données avec l'aptitude au tir de chacun des sujets examinés.

AMPOULES VIEL Auto-Injectables B tées S.G.D.G.

L'emploi de nos ampoules directement auto-injectables, avec la seringue de Pravaz, évite tout danger d'abcès.
TOUS MÉDICAMENTS, LA BOITE DE 10 — 4 FRANCS
LABORATOIRE VIEL, RENNES

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

La meilleure forme pour l'usage du PYRAMIDON
COMPRIMÉS ADRIAN
3 comprimés par crise.
Échantillons.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUÉES HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

POUDRE D'ANIODOL Non toxique. Non caustique.
Remplace l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins).
SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

Pour compléter et préciser les notions qu'ils avaient ainsi acquises, ils ont examiné ou obtenu, par un questionnaire spécialement rédigé à cet effet, des renseignements sur la vue des tireurs champions du monde et des premiers lauréats des concours de tir qui ont bien voulu se soumettre à leur examen ou répondre à leur appel.

Enfin ils ont examiné l'appareil oculaire des dix meilleurs tireurs à la carabine d'un régiment de cavalerie (1er cuirassiers).

Ils ont constaté qu'on peut être un bon, un excellent tireur même, avec une acuité visuelle et une réfraction défectueuses, et même, ce qui paraît *a priori* quelque peu paradoxal, que, pour un même régiment, le nombre de mauvais tireurs ayant une mauvaise vue est dans une même proportion que le nombre d'excellents tireurs ne possédant qu'une acuité médiocre. Chez un sergent dont ils rapportent *in extenso* l'observation, l'acuité de l'œil viseur mesurée avec les échelles optométriques ordinaires n'est que de 0,3, soit à peu près égale à 1/3 de la normale, ce qui n'a pas empêché ce sous-officier d'obtenir plusieurs médailles aux concours de tir et une mention honorable du ministre de la Guerre. C'est un astigmate hypermétrope de 4 dioptries, qui penche la tête afin de voir avec le méridien le plus voisin de la normale, celui qui lui donne la vision la plus nette.

Un officier supérieur, tireur des plus connus des concours nationaux et internationaux au fusil et au revolver, est atteint d'astigmatisme myopique des deux yeux, qui détermine l'abaissement de l'acuité visuelle à 2/3 du meilleur œil et 1/3 de l'autre.

Plusieurs champions de France sont soit presbytes soit hypermétropes. D'autres, parmi les meilleurs tireurs du monde, sont atteints de myopie parfois assez élevée; mais ces derniers ont tous recours à des verres pour corriger leur amétropie.

* * *

Il n'y a pas lieu de s'étonner de ces faits si on veut en rechercher l'explication dans la physiologie oculaire. Pour pointer l'arme, le tireur doit diriger sur le but à atteindre la ligne de mire, ce qui consiste à faire coïncider deux images rétiniennes, l'une fournie par le guidon, l'autre par le point à viser. L'œil ne pouvant être adapté pour deux objets inégalement distants, l'une de ces images est forcément diffuse. Les auteurs se sont demandés quelle est celle de ces deux images que le tireur sacrifie, quelle est celle qu'il consent à percevoir moins distinctement que l'autre. Le cercle de diffusion est-il fourni par le guidon ou par le but à atteindre?

Avec Schmidt-Rimpler, Seggel, Dor, et la plupart des oculistes qui se sont occupés de cette question, ils ont conclu que ce qu'il faut bien voir, pour viser, c'est le *guidon* et le *cran de mire*.

Ce qui importe surtout dans le tir, c'est moins la réfraction statique que la réfraction dynamique. L'image du point à viser est forcément diffuse, le tireur accommodant surtout pour le guidon.

Par conséquent, que le tireur soit emmétrope ou au contraire affecté d'un vice de réfraction, peu importe; le résultat sera le même dans les deux cas, car, s'il est emmétrope, il n'obtiendra sur la rétine, pour le but à viser, *point éloigné*, qu'un cercle de diffusion, l'œil étant accommodé pour une *distance rapprochée*, le guidon; si au contraire il est amétrope, le but à viser fournira encore une image diffuse, l'œil ne pouvant, par le fait de sa réfraction statique, recevoir sur la rétine que de telles images pour tous les objets situés au delà de son *punctum remotum*.

Il en résulte qu'à la condition que l'acuité visuelle soit *simplement suffisante pour distinguer même confusément le but à viser* le tir est possible, ce qui explique notamment comment certains myopes, de degré faible, sont cependant d'excellents tireurs à l'œil nu comme l'a observé Landolt.

Par contre, si la *réfraction statique* est d'une importance minime, il n'en est pas de même de la *réfraction dynamique*. Pour bien tirer, il est nécessaire que la *puissance positive d'accommodation soit conservée normale*.

En effet, ce que le tireur doit voir nettement, c'est le guidon; or, le guidon est à une distance rapprochée de l'œil. Cette distance est variable suivant la nature de l'arme et la position du tireur. D'après les mensurations faites au champ de tir, elle varie pour le fusil Lebel entre 117 cm. 6 et 119 cm. 5, suivant que l'homme épaule nettement ou refuse l'épaule. Pour la carabine, elle est en moyenne de 88 cm. 80.

Avec une myopie de 2 dioptries, le *punctum remotum* est à 0 m. 50 et sans correction de son amétropie, le myope de ce degré ne peut par conséquent pas distinguer nettement le guidon situé au minimum dans la carabine de cavalerie à 88 cm. 80. Ceci nous explique pourquoi tous les myopes dont l'amétropie est supérieure à 1 dioptrie, sont obligés de faire usage de verres pour le tir.

Pour bien voir le guidon de l'arme, il faut donc posséder une *puissance positive d'accommodation suffisante*. Que cette puissance soit diminuée pour une cause ou pour une autre, et l'exercice du tir deviendra pénible, difficile; les résultats obtenus seront défectueux.

Normalement, les tireurs de régiment ont ou doivent avoir une puissance accommodative suffisante, si l'on s'en rapporte au schéma classique de Donders; il s'agit, en effet, de jeunes gens de vingt à vingt-cinq ans; leur puissance d'accommodation est de 9 à 10 dioptries. Mais on peut devenir presbyte avant l'âge; c'est le cas des hypermétropes atteints si souvent d'*asthénopie accommodative*, lorsqu'ils veulent fixer le guidon,

Au mois de mars 1904, M. le Dr Saint-Yves Menard présentait à l'Académie de médecine une note de M. X. Dybowski qui attirait l'attention du monde médical sur le yoghourt, lait caillé spécial, que l'on trouve en Bulgarie.

A la même époque, M. le Dr Tulbendjan, communiquait à la Société des Sciences médicales d'Angers ses diverses observations sur l'emploi du yoghourt (*Journal des Sciences médicales d'Angers*, Novembre 1904).

Dès ce moment, les avantages du yoghourt étaient nettement déterminés, mais on était dans l'impossibilité absolue de le préparer dans nos pays.

Le 31 janvier 1905, M. le Dr Saint-Yves Menard présentait à l'Académie de médecine la nouvelle communication de M. X. Dybowski, faisant connaître qu'il était parvenu à isoler la Maya, ou ferment bulgare, à la cultiver et à la dessécher, de façon à pouvoir la transporter sous n'importe quel climat, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1905, M. Mazé, de l'Institut Pasteur, reconnaît qu'au point de vue pureté des ferments, le yoghourt est le seul lait caillé qui puisse offrir toutes les garanties, grâce à la température élevée à laquelle la Maya fait fermenter le lait, température qui assure l'anéantissement des autres ferments ou levures. (*Annales de l'Institut Pasteur*, Juin 1905.)

Une des grandes qualités du yoghourt, qui le rend éminemment supérieur au lait est que, d'un goût exquis lorsqu'il est bien fait, il ne rebute jamais le malade, comme cela arrive presque toujours avec le lait quand on est obligé de le prescrire longtemps.

Pour ma part, dit le Dr Tulbendjan, de Constantinople, je m'en sers continuellement dans toutes les maladies où le régime lacté est indiqué, et je n'ai qu'à m'en féliciter. J'en donne un grand bol d'une ocque (1 kil. 282) par jour. Dans la fièvre typhoïde, dans la pneumonie, dans les grippes graves, dans la scarlatine et dans toutes les maladies infectieuses, on voit immédiatement, sous l'influence du yoghourt, la quantité d'urine augmenter, l'élimination des toxines s'élever, en même temps on évite le dépérissement du sujet.

Dans les vomissements incoercibles de la grossesse, j'ai vu toujours le yoghourt donner les meilleurs résultats, et les femmes continuer leur grossesse jusqu'au bout.

Dans les cas d'adynamies, j'administre le yoghourt sucré; je le donne glacé dans les cas d'intolérances gastriques : chez les dyspeptiques hyperchlorhydriques, je le fais suivre d'un ou deux cachets de bicarbonate de soude, ou d'un verre d'eau minérale alcaline quelconque.

Le yoghourt présente sur le lait un autre avantage : sous un moindre volume, il correspond à une plus grande quantité de lait, par conséquent, à plus de nourriture.

Le yoghourt sera recommandé dans les affections de l'estomac et de l'intestin, dyspepsies, appendicite, dans la constipation et toutes les auto-intoxications d'origine intestinale, dans la diarrhée verte des enfants, dans la furonculose, l'acné, l'eczéma, les rougeurs de la face, les migraines, la neurasthénie, l'artériosclérose, l'anémie, la goutte, le diabète, le cancer, la tuberculose, enfin, dans les maladies infectieuses, lorsqu'il est nécessaire de faire la désinfection du tube intestinal, en alimentant le malade avec une nourriture légère qui augmente, en même temps, la quantité d'urine. Le yoghourt favorise la nutrition, empêche la déperdition, active la guérison des catarrhes chroniques du tube digestif, augmente le poids du corps. Il permet de lutter contre la débilitation de la nutrition, d'où qu'elle provienne.

Enfin nous citerons la très intéressante observation recueillie par le Dr Martinet, dans un cas de néoplasme, publiée dans la *Presse Médicale* du 3 Mars 1906, montrant quel précieux auxiliaire le médecin possède dans le yoghourt pour le traitement de cette affection.

Vente du véritable Lait caillé bulgare SOCIETE DE LA MAYA BULGARE, **3, Chaussée d'Antin** (Tél. 214.40) et **16, rue Popincourt** (Tél. 917.71). — *Livraison chaque jour dans Paris.* — La Société livre aussi le Ferment Maya bulgare et la petite étuve pour préparer le yoghourt chez soi.

ANÉMIE. CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NÉVRALGIES

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison granulée nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux

RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, *et toutes Pharmacies.*

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu
Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME — 1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE

DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE

Phie ...LAS, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chloroformée A MILLIGR. — 1 à 3 par jour.

es presbytes qui ne peuvent tirer qu'avec des
es correcteurs, comme le démontrent les
breuses observations recueillies par les au-
s chez les tireurs d'élite ayant dépassé la
rantaine.

* * *

M. Ginestous et Coullaud ont tiré de leur
le des conclusions au point de vue militaire.
s ont recherché jusqu'à quelle limite de capa-
visuelle un homme *jeune* est apte à faire un
tireur. En d'autres termes, quel est le mini-
n d'acuité nécessaire pour le tir, et plus par-
lièrement pour le tir de guerre?
'analyse de leurs observations leur a permis
onstater que tous les bons tireurs, à l'excep-
d'un seul, ont une acuité supérieure à 1/2; un
r d'élite n'a qu'une acuité égale à 1/2 de
viseur. Ce sont l'un et l'autre des astigmates
rmétropes ayant un méridien vertical ou
rement oblique emmétrope ou très voisin de
ormale.
s ont donc, d'accord sur ce point avec la plu-
des auteurs français et étrangers, posé en
cipe que l'acuité de 1/2 du meilleur œil est
mite inférieure au-dessous de laquelle un
me est incapable de faire un bon tireur.
es règlements les plus récents sur l'aptitude
sique au service militaire adoptent avec rai-
la même règle et exemptent du service armé
conscrits dont l'acuité du meilleur œil est
rieure à 1/2. En Allemagne, l'acuité doit être
rieure à 1/2; en France, au moins égale
2; en Italie, une acuité de 1/3 est exigée.
s ont constaté la suprématie de la vision
oculaire dans l'exercice du tir. Un seul œil
t pour viser juste; aussi estiment-ils qu'on
sans inconvénient incorporer, comme en
magne, dans le service armé, des hommes
ant, de leur mauvais œil, qu'une acuité
/20, 1/30 et même 1/50, la vue de l'œil viseur restant, bien entendu, égale ou supérieure à 1/2.

La vision binoculaire, nécessaire à l'appréciation des distances et au choix de la hausse, tend à jouer, pour le tir de combat dans les guerres futures, un rôle de moins en moins considérable, par suite de la tension de la trajectoire obtenue au moyen des projectiles à extrémité pointue (balle D en France, balle S en Allemagne).

PRATIQUE MEDICALE

Traitement de la néphrite de la scarlatine par l'essence de térébenthine.

L'origine de ce mode de traitement est due à Tobeitz, qui fit paraître, en 1902, dans *Archiv für Kinderheilkunde* une étude sur la « Terpentin-Therapie bei Scharlach ». Tobeitz a employé l'essence de térébenthine sans autres médicaments dans 132 cas, et, chez 3 malades seulement, il constata un peu d'albumine dans les urines, tandis que chez les malades non traités par cette méthode, mais soumis à la même diète lactée, la néphrite apparaissait chez plus de 14 pour 100. Pippingskold a prescrit l'essence de térébenthine comme prophylaxie contre l'albuminurie, mais considère ce médicament comme contre-indiqué lorsque celle-ci est apparue. Enfin Szontagh insiste sur l'influence nocive de l'essence de térébenthine sur les reins et ne conseille pas son usage.

En présence de ces contradictions, C. Iasnov (*Prakticheski Vratch*, 1905, n° 40, p. 798) a employé dans 20 cas de néphrite compliquant la scarlatine (dont 12 hémorragiques) l'essence de térébenthine selon la méthode de Tobeitz (Ol. Terebinth. gallic. rectificat. 15 à 25 gouttes par jour en 3 prises dans du lait). Diète lactée. Pas d'autres médicaments. Pas de bains. Analyse des urines tous les jours. L'auteur a observé la disparition rapide du sang et de l'albumine dans les urines, en général dès la première semaine, quelquefois au début de la seconde, et il conclut que l'essence de térébenthine à doses faibles n'irrite pas les reins, même malades; qu'elle hâte la disparition de l'albumine et du sang dans l'urine, et que, pour obtenir des résultats plus stables, il est sage de donner ce médicament même quelque temps après la disparition de l'albumine et du sang.

M. DE KERVILY.

LIVRES NOUVEAUX

Cassaigneau. — *Essai sur un quatrième état de la matière.* Un vol. in-18°, Paris, 1906, Prix : 3 fr. 50 (A. MALOINE, éditeur.)

Dans ce petit volume, l'auteur, prenant pour point de départ l'étude des dernières découvertes accomplies dans le domaine de la physique, en déduit qu'à côté des trois états déjà connus de la matière, état gazeux, état liquide, état solide, il convient d'en reconnaître un quatrième qui est justement, d'après lui, « la forme la plus importante et fondamentale de la matière, et qui existe partout sans solution de coutinuité ».

Or, estime M. Cassaigneau, c'est dans l'étude seule de ce quatrième état que l'on peut trouver l'explication de la nature et de l'origine de l'électricité, des phénomènes encore inexpliqués de la diffusion des gaz et de l'osmose, et, en somme, la clef de la compréhension de la vie et des phénomènes vitaux.

G. V.

BIBLIOGRAPHIE

1191. — **W. Arbuthnot Lane.** — THE OPERATIVE TREATMENT OF FRACTURES. 1 vol. in-4° de 144 pages avec 103 figures. (*The Medical Publishing C°.*)

Névrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de *Névrosthénine* pèse 7 centigr. et contient 2 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La *Névrosthénine* ne contenant *ni chaux, ni sucre, ni alcool*, peut être administrée sans inconvénient aux *diabétiques, albuminuriques, artério-scléreux*, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à chaque repas.

Anémie cérébrale, Neurasthénie et tous les *Epuisements nerveux.*

Prix du flacon compte-goutte **3** *fr.*, rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de *l'Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII° Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour **Enfants**; dix à cinquante gouttes pour **Adultes.**
Demander Brochure sur **l'Iodothérapie physiologique** *par le* **Peptoniode.**
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus
Reconstituant Général - Apéritif Puissant
Traitement de l'Insomnie nerveuse
Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure
Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125
1 boîte ou flacon d'origine : **4** fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait ⌀ Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques
Favorise la Croissance
Doses : *jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour*
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour
Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Echantillons gratuits et littérature : **SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BALE,** Département pharmaceutique, **St-FONS** (Rhône).

ADERMINE
Novel Excipient pour Pommades.

Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être **complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable.** — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis (Voir *Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et Syphil.*, janv. 1906, n° 1, p. 24). — *Echantillons gratis.*

BONETTI frères, 12, rue Vavin, PARIS

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

Savon doux ou pur, **S.** hygiénique, **S.** surgras au Beurre de cacao, **S.** à la glycérine (*pour le visage, la poitrine, le cou*, etc.). — **Savon** Panama, **S.** Panama et Goudron, **S.** Naphtol, **S.** Naphtol soufré, **S.** Goudron et Naphtol (*pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrée, alopécie, maladies cutanées*). — **Savon** Sublimé, **S.** Phéniqué, **S.** Boriqué, **S.** Créoline, **S.** Eucalyptus, **S.** Eucalyptol, **S.** Résorcine, **S.** Salicylé, **S.** Salol, **S.** au Solvéol, **S.** Thymol (*accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole*, etc.), **S.** intime (à base de Sublimé)

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon à l'Ichthyol, Acné, Rougeurs. **S.** Panama et Ichthyol, **S.** Sulfureux, **S.** à l'huile de Cade, **S.** Goudron, **S.** Boraté, **S.** Pétrole, **S.** Goudron boriqué. — **S.** iodé à 5 °/₀ d'iode. — **S.** mercuriel à 33 °/₀ de mercure. — **S.** au Tannoforme contre les sueurs. — **S.** au B. du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 1 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE,** du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de STOVAÏNE BILLON

Aucun Accident toxique à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arr
TÉLÉPHONE **517-12**

THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLE

AMYLOGÈNES
Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amerique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACI

USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une ***augmentation rapide du poids*** des malades; ***fait tomber la fièvre*** et disparaître la purulence des crachats chez les ***TUBERCULEUX.***

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les **Hôpitaux de Paris** et les **Sanatoria.** *Communications à* l'**Académie des Sciences,** la **Société de Biologie,** de **Thérapeutique.**
Thèse sur l'**HISTOGÉNOL,** *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*

HISTOGÉNOL NALINE

à base de Nucléarrhine.

FORMES :
Emulsion : *2 cuill. à soupe par jour.*
Élixir : *2 cuill. à soupe par jour.*
Granulé : *2 mesures par jour.*
Ampoules : *1 ampoule par jour.*

Médication Arsénio-Phosphorée organique.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : *S'adresser à* NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

Flacons

INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES
Toujours — formuler
PILULES — SIROP
ANÉMIE — BLANCARD — LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — SCROFULE — IODE

Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. — *Re* les IMITATIONS DANGER

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 1 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide,** *relèvent le* **cœur affaibli,** *dissipent*

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de **CATILLON,** *Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cryst.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Phcies.*

Granules de Catillon
1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR DIUR

VALEUR COMPARATIVE DES MÉDICATIONS DIURÉTIQUES

Les THÉOBROMINES du COMMERCE

Sont souvent **impures** et **falsifiées** (Huchard);
Sont d'origine et d'action **différentes** (Pr Pouchet);
Sont rarement **exemptes de caféïne** (Vadam);
Ne sont pas toujours **bien supportées** (Monin);
Déterminent fréquemment des **Céphalées** (Huchard);
Provoquent souvent des **Troubles digestifs** (Calonne);
Sont en certains cas **lentes à agir** (Metifeu);
Se montrent trop fréquemment **inconstantes** (Raspail);
Restent parfois même **inactives** (Dubois).

LA SANTHÉOSE

est irréprochablement pure;
de source toujours identique;
de composition rigoureusement fixe;
sa tolérance est remarquable;
elle ne provoque ni céphalalgie;
ni le moindre trouble toxique;
son action est toujours prompte;
c'est le plus constant;
le plus fidèle des diurétiques.

La **SANTHÉOSE,** qui constitue la médication par excellence de toutes les affections cardiaques, rénales et arthritiques, est un *PRODUIT FRANÇAIS*, justifiant des plus hautes références. Elle existe sous quatre formes :

1° La **SANTHÉOSE PURE,** puissamment efficace chez les cardiaques et les brightiques;
2° La **SANTHEOSE PHOSPHATÉE,** recommandée dans les infections et les convalescences;
3° La **SANTHEOSE CAFÉINEE,** grandement précieuse dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asystolie, etc.:
4° La **SANTHEOSE LITHINEE,** traitement de choix de l'artério-sclérose, rhumatisme, goutte, etc.

Pour éviter toute *substitution ou contrefaçon*, la **SANTHÉOSE** n'est ni vendue en vrac ni détaillée, et ne se présente que par boîtes de 24 cachets. Ces cachets, qui ont la forme d'un cœur, seront prescrits à la dose de 1 à 4 par jour. Le prix de la boîte de 24 cachets, représentant au moins 12 gr. de principe médicamenteux, est de **5 francs**, ce qui met la spécialité à un prix *meilleur marché* que les diurétiques les plus couramment prescrits. — Exiger sur chaque cachet la marque « **Santhéose** ».

USINE à JOUY-SUR-MORIN (Seine-et-Marne).

Vente en gros : 4, rue du Roi-de-Sicile, PARIS (4e).

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques.** Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

NOVOCAINE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés.** Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.**

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.**

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent.
Antiblennorrhagique.

L'**Argonine**, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au **traitement** de la **blennorrhagie** de **l'urèthre antérieur** et **postérieur** de l'homme, de **l'urèthre** et de **l'utérus** de la femme, à cause de son **action absolument privée d'effets irritants**, et **fortement antiseptique.** Indiquée surtout dans des cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués. L'Argonine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie. On l'emploie en solutions à 1-2 °/₀. Recommandée en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 °/₀.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthésie** de l'estomac, l'**ulcère rond**, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse. 0,2 à 0,5, avant le repas.

Dans le pratique **oto-rhino-laryngologique**, dans toutes espèces de **catarrhes**, d'**ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx**, etc.

Dans la **strangurie**, les **uréthrites**, les **affections hémorroïdaires.**

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses**, telles que **brûlures, ulcère de jambe, intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczémas.**, etc, en nature, ou en épispasme mélangée à du Dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 °/₀.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgaïacol.

La **seule préparation à base de gaïacol** absolument **non toxique, non caustique,** en même temps **légèrement anesthésique,** donnant facilement du gaïacol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées. Les **diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son emploi.** En outre, a fait ses preuves comme **désodorant** dans l'**ozène**, la **stomatite**, les **carcinomes sanieux**, etc.

Comme **désinfectant** dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

OXAPHORE "CREIL"

Solution alcoolique à 50 °/₀ d'oxycamphre, le **seul remède inoffensif agissant sûrement contre la dyspnée.** Employé avec succès dans l'**asthme nerveux et bronchique, l'emphysème** et les **affections organiques du cœur** avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'Oxaphore trop faibles.

Dose efficace de l'Oxaphore : 2—4 jusqu'à 6 gr. par jour.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Necker. — Par délibération du Conseil municipal de Paris, une somme de 2.000 francs est mise à la disposition de la direction de l'Assistance publique pour compléter les travaux d'aménagement et d'installation à l'hôpital Necker des collections anatomiques de M. le professeur Guyon.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Officiers de l'instruction publique. — MM. Camus, Feltz, à Paris.

Officiers d'Académie. — MM. Bernard, médecin-major de 2e classe; Villeneuve, à Andrésy (Seine-et-Oise).

Corps de santé militaire. — M. Février, médecin principal de 1re classe, est nommé directeur du service de santé de la division d'Oran.

— Les officiers du cadre auxiliaire du corps de santé dont les noms suivent sont rayés des cadres, savoir : MM. Jeunhomme, Sommeillier, médecins principaux de 2e classe; Blanchetière, médecin-major de 1re classe; Collin, médecin-major de 2e classe; Theveny, médecin aide-major de 1re classe; Dunand, Granier, Tauzin, médecins aides-majors de 2e classe.

Service de santé de la marine. — Sont promus dans le corps de santé de la marine : Au grade de médecin principal, M. Michel, médecin de 1re classe; au grade de médecin de 1re classe, MM. Hédie, Lasserre, médecins de 2e classe.

— Est promu, dans la réserve de l'armée de mer, au grade de médecin principal, M. Gauran, médecin principal de la marine en retraite. M. Gauran est attaché au port de Toulon.

— M. le médecin principal Plagneux, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer comme médecin de division sur le *Guichen*.

— MM. les médecins principaux de réserve Cousyn, du port de Cherbourg, et Esclaugon, du port de Toulon, sont maintenus, sur leur demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— M. le médecin de 1re classe Dessemond-Sicard, du port de Cherbourg, est désigné pour aller occuper la prévôté de médecin résidant à l'hôpital maritime de Port-Louis.

— M. le médecin de 1re classe Bartet, est nommé, pour cinq ans, aux fonctions de professeur de séméiologie médicale, et de petite chirurgie à l'Ecole annexe de médecine navale de Rochefort.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin-major de 2e classe Seguin, est désigné pour diriger, dans la position d'activité hors cadres, le laboratoire bactériologique d'Hanoï.

— Sont affectés : A la brigade de réserve de Chine au Tonkin, M. Audhuy, médecin aide-major de 2e classe.

A Madagascar, MM. Hecamier, Millon, médecins aides-majords de 2e classe.

En Afrique occidentale, M. Cazanove, médecin aide-major de 1re classe.

En France, MM. Marotte, Brachet, Martin, médecins-majors de 2e classe; Neel, Vielle, Thélème, médecins aides-majors de 1re classe.

Congrès international de médecine. — Le prochain Congrès international de médecine aura lieu à Budapest en 1809.

— Le prix du Congrès de Moscou en 1897 a été attribué à M. Laveran. Celui du Congrès de Paris de 1900 a été décerné au professeur Erlich.

Commission d'hygiène agricole. — Un décret vient d'instituer auprès du département de l'Agriculture une Commission d'hygiène agricole.

Sont nommés membres de cette Commission : MM. Brouardel, *président*; Chauveau, Bordas, *vice-présidents*; Binot, Blanc, Borne, Georges Brouardel, Cazelles, Chassevant, Fagot, Herbert, Martel, Thoinot, Thierry, Vallée, Guiart, *membres*.

Commission d'élaboration du tarif des frais médicaux. — MM. Milliès-Lacroix, sénateur, et Puech, député, ont été nommés membres de la Commission chargée de l'élaboration du tarif des frais médicaux et pharmaceutiques en cas d'accidents du travail, en remplacement de MM. Chovet et Mirman.

Contre la maladie du sommeil. — La Société de géographie organise une mission scientifique qui sera chargée d'aller étudier sur place en Afrique la maladie du sommeil et les moyens de la combattre. Cette mission comprendra trois médecins bactériologistes : deux partiront pour le Congo; le troisième, qui serait prêt à aller relever l'un de ces derniers, resterait à l'Institut Pasteur.

Un laboratoire sera créé à Brazzaville et à ce laboratoire sera annexé un hôpital spécial où seront traités les nègres et les blancs souffrant de la maladie du sommeil.

La mission sera dotée d'une subvention d'environ 200.000 francs et pourra grâce à cette subvention poursuivre ses travaux pendant dix-huit mois. Les études et observations de la mission seront centralisées à l'Institut Pasteur.

Les derniers détails de son organisation seront réglés par un comité composé de MM. Le Myre de Vilers, président de la Société de géographie, Dr Kermorgant, chef du service de santé des colonies, Perrier, directeur du Muséum, de Guerne, les Drs Brumpt, de la mission du Bourg de Bozas et Hamy.

La saison à Châtel-Guyon. — La Société des Eaux de Châtel-Guyon rappelle à tous les intéressés que l'ouverture de la saison dans cette station a lieu au 1er Mai, et que, pendant ce mois de Mai, comme aussi en Octobre, les cartes d'abonnements et les tickets d'opérations thermales sont à demi-tarif pour tous les baigneurs indistinctement.

Elle met en service dès cette année toutes les cabines de 1re classe (80) des bains à eau courante dans ses nouveaux thermes; mais elle se voit forcée de reculer à l'an prochain l'ouverture des bains de 2e classe, que remplacent d'ailleurs en quelque sorte les demi-tarifs réglementaires de Mai et d'Octobre.

Médecin de l'état civil. — M. Rolet, est nommé médecin de l'état civil du XIIe arrondissement (3e circonscription), en remplacement de M. Robin, démissionnaire.

Voyage scientifique. — Les Excursions médicales internationales, œuvre scientifique d'enseignement médical complémentaire par la visite des Universités étrangères (anciens voyages médicaux), dont le siège est à Paris à l'hôtel des Sociétés Savantes, organisent pour les vacances 1906 une excursion médicale en Allemagne.

Le Conseil d'administration des E. M. I. se met dès maintenant à la disposition des membres du corps médical pour tous renseignements à ce sujet. S'adresser à l'administrateur fondateur des E. M. I., M. Etienne Bazot, au service-annexe de l'œuvre, 184, rue de Rivoli, Paris.

Conseil d'arrondissement de Saint-Denis. — Dans sa dernière session le Conseil d'arrondissement de Saint-Denis a émis ou renouvelé les vœux suivants :

— Que les communes se groupent en vue d'établir des hospices intercommunaux, qui remédieront à tous les inconvénients de la centralisation, procureront aux habitants des communes groupées toutes les facilités pour visiter leurs malades sans grands frais, et permettront aux parents des personnes décédées à l'hôpital de les faire enterrer dans la commune qu'ils habitent.

Et invite l'Administration à étudier la question afin de

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES
Sans aucune Toxicité
EAU OXYGÉNÉE
CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.
Rigoureusement NEUTRE et STABLE
PERHYDROL-MERCK
FLACONS spéciaux de 50 et 200 grammes pour la préparation extemporanée d'eau oxygénée chimiquement pure à TOUTES CONCENTRATIONS
Ex. : 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H²O² à 10 vol.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES de TANNIN-MERCK CHIMIQUEMENT PUR
Dosées à 0 gr. 20 — 5 à 10 par jour.
TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES
PHARMACIE du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Interêt Public Décret du 12 Août 1897.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES du Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

"IODALIA"
Nouvelle Médication iodée intensive
Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.
Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par cuillerée à café.
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Ech. sur demande. Phie PÉLOILLE, 2, Fg St-Denis, Paris.

LA NATURE
ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

Suraliment concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la
POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOUARD
Matière albuminoïde . . . 78
— grasse 8
Sels du sang (chlorure, phosphates). 4
90 %
PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange.
Ech. et litt. adressés franco sur demande aux médecins. —
P. ANDOUARD, pharmacien. r. Kervégan, NANTES

procurer aux communes toutes les facilités financières pour la construction d'hôpitaux intercommunaux.

— Que l'Administration applique la patente aux religieuses dites gardes-malades qui ont des établissements spécialement organisés *ad hoc*, et qui font de cette profession un commerce en commun.

— 1° Que les viandes provenant des tueries particulières de la banlieue soient estampillées par les soins de la Préfecture de police, avec une marque analogue à celle employée aux abattoirs de La Villette;

2° Que le nombre des vétérinaires sanitaires chargés de la visite desdites tueries et des marchés volants soit augmenté de façon à rendre leur surveillance plus efficace.

— Qu'une subvention de 1.000 francs soit accordée au dispensaire antituberculeux de Saint-Ouen.

— Que des consultations du soir aient lieu régulièrement dans les hôpitaux, les consultations du dimanche étant insuffisantes pour ce service.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Épreuve clinique. — *Séance du 25 Avril.* — — Ont obtenu : MM. Wiart, 16; Labey, 16; Proust, 15.

Séance du 27 Avril. — Ont obtenu : MM. Mouchet, 19; Schwartz, 13; Marcille, 15.

Séance du 30 Avril. — Ont obtenu : MM. Alexandre, 18; Lecène, 17; Fredet, 18.

Séance du 2 Mai. — Ont obtenu : MM. Veau, 19; Iglave, 18; Kendirdjy. 15.

Séance du 4 Mai. — Ont obtenu : MM. Grégoire, 13; Chevrier, 17; Baumgartner, 14.

Séance du 7 Mai. — Ont obtenu : MM. Guibé, 13; Isen, 16.

Consultation. — *Séance du 9 Mai.* — Ont obtenu : MM. Mouchet, 18; Fredet, 14; Baumgartner, 16; Proust, 20.

Ophtalmologiste des hôpitaux. — Le concours vient de se terminer par la nomination de MM Dupuy-Dutemps et Poulard.

Assistant d'oto-rhino-laryngologie des hôpitaux. — Un concours pour la nomination à deux places d'assistant titulaire et à deux places d'assistant adjoint des services spéciaux d'oto-rhino-laryngologie des hôpitaux de Paris, pour entrer en fonctions le 1er Juillet 1906, sera ouvert le vendredi 1er Juin 1906, à midi dans la salle des concours de l'administration, rue des Saints-Pères, 49.

Cette séance sera consacrée à la composition écrite.

Les candidats seront admis à se faire inscrire à l'administration centrale (service du personnel), de midi à 3 heures, du mardi 1er Mai 1906 au lundi 14 du même mois inclusivement.

Adjuvat. — Le Jury est composé de MM. Terrier, Poirier, Segond, Rieffel, Branca. Suppléants : MM. Auvray, Gosset.

Médaille d'or de l'Internat en pharmacie. — Le concours annuel pour les prix à décerner à MM. les élèves internes en pharmacie des hôpitaux et hospices, sera ouvert le vendredi 8 Juin, à midi précis dans la salle des concours de l'administration, rue des Saints-Pères, 49.

MM. les internes en pharmacie sont prévenus qu'en exécution des dispositions du règlement général sur le service de santé, tous les internes en pharmacie des hôpitaux et hospices sont tenus de prendre part à ce concours, sous peine d'être considérés comme démissionnaires, et, comme tels, d'être privés du droit de continuer leur service dans les hôpitaux.

Ils devront, en conséquence, se faire inscrire à l'administration centrale (service du personnel), de 11 heures à 3 heures, jusqu'au samedi 19 Mai inclusivement.

Élève en pharmacie des dispensaires. — Le jury du concours pour les places d'élève en pharmacie des dispensaires est définitivement composé de MM. Merklen, Pâquet, Guéguen, Lafont, Lefèvre, qui ont accepté.

Ecole du service de santé militaire. — Les candidats à l'Ecole du service de santé militaire devront se faire inscrire avant le 16 Mai au soir dans les préfectures, dans les conditions indiquées par l'instruction du 5 Février 1905.

Les épreuves écrites d'admissibilité auront lieu le 13 Juin dans les centres déterminés par l'instruction précitée.

Les dates des épreuves orales seront fixées ultérieurement.

Il n'est apporté aucun changement au programme des connaissances exigées.

Hôpitaux de Toulouse. — Après concours ont été nommés : M. Cestan, médecin, et M. Henri Caubet, chirurgien des hôpitaux de la ville de Toulouse.

Hôpitaux de Nice. — Après concours, ont été nommés médecin, M. Ardoin; chirurgien, MM. Schmid, Figuiera, Bensa; chirurgien-accoucheur, M. Ciauda.

Hospices civils de Saint-Étienne. — Il sera ouvert à l'Hôtel-Dieu de Lyon, le lundi 15 Octobre prochain, un concours public pour une place de chirurgien.

Le chirurgien à nommer entrera en fonctions le 1er Juillet 1907; son traitement est fixé à 2.000 francs par an.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat des Hospices, rue Valbenoite, 40, à Saint-Etienne.

Ecole de médecine d'Amiens. — Un concours s'ouvrira, le 5 Novembre 1906, devant l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie d'Amiens, pour l'emploi de chef des travaux d'anatomie et d'histologie à ladite Ecole.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

RENSEIGNEMENTS

Très pressé : A céder, cause décès, *bon poste* et matér. médic. Grandes facil. Riche canton Ouest. Ecrire *P. M.*, 250.

Cours pratique des maladies des voies urinaires du Dr Banzet, ancien chef de clinique à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique (leçons pratiques les mardi et vendredi soir, à 8 heures à la clinique, 76, quai des Orfèvres). Nombre des élèves limité. Pour renseignements, s'adresser au Dr Banzet, 19, rue de Lille.

Postes médicaux. — Achat et vente, Remplacements. Rensts grat. 12e année. — Bougault, 45 boul. St-Michel.

A louer, 25 k. de Paris, 168 m. alt., camp. meubl. ou non, parc, tél., voit. Chaloub, 67, b. Malesherbes, Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

LUSOFORME. Antiseptique, Désinfectant.
Ni irritant. — Ni toxique.
Formol saponiné. — Odeur agréable et Désodorisant.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON
Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES
Le nom de GUBLER et le timbre aux deux bouteilles renversées.
Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

KÉPHIR SALIÈRES
Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté.
« *Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses ferments* (Méthode Duclaux, Direct' Inst. Pasteur) *et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger.* »
Dr Deroide, prof. agrégé de Pharmacie, Fac de Lille.
Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.
Usine : Laiterie Scientifique de Pontoise (S.-&-O.). — Dépôt : Adrian, Rue de la Perle, Paris.
Détail : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

Mg.O2. HOPOGAN Usage Interne
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS *exclusivement préparés pour* l'Usage Médical
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN Usage Externe Zn.O2.

IODOL
Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
MENTHOL-IODOL pour INSUFFLATIONS RHINO-LARYNGIENNES
Combinaison à 1 °/° de Menthol.
Brochures et Échantillons). M. REINICKE, *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.*

GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base d'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 à 8 Granules par Jour.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Indus triels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux r pas.
E. TROUETTE. 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées* et *Prurigineuses* et *Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE *préparé à froid.*
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.
CHAIX & Cie. 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

SOLUROL

(ACIDE THYMINIQUE PUR)

« *L'acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.*
« *Son absence chez les goutteux détermine la rétention des urates et leur*
« *dépôt dans les tissus* ».

Le **SOLUROL** *(Acide thyminique)* doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme.**

Dans la **Goutte aiguë**, le *SOLUROL* diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le *SOLUROL*, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés** dosés à **0gr. 25.**

DOSE MOYENNE : 0gr. 75 de SOLUROL par jour, soit 3 COMPRIMÉS. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & Cie, PARIS.

1096

Remplace la viande crue

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE

M. le Dr Dujardin-Beaumetz, Membre de l'Académie de Médecine :

« *J'emploie, contre l'anémie, un* **sirop** *d'***Hémoglobine** *préparé par un* « *de mes élèves,* **M. Deschiens** *... Il m'a donné, à la dose de 2 cuillerées* « *à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux. Je ne saurais trop* « *recommander cette préparation et je la considère comme le plus puissant des* « *ferrugineux.* » Société de thérapeutique.

SIROP : 2-4 cuil. à soupe. GRANULÉ. VIN. Le flacon **4** fr.

Dépôt général : **DESCHIENS, 9, rue Paul-Baudry, Paris.**

DÉTAIL : Phie *Chaumel, 87, r. Lafayette, Paris et* Phies.

SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure,* complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmaciens de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.